



Our Future, Our Commitment, Our Students

30 de noviembre de 2007

Bert L'Homme, Ph.D.
Superintendent

bertlhomme@fcschools.net

Thomas E. Piper, Ed.S.
Assistant Superintendent
for Auxiliary Services

Lynn M.N. Henderson, M.S. Ed.
Assistant Superintendent
for Human Resources

Douglas H. Moore, C.P.A.
Assistant Superintendent
for Business and Finance

Edward E. Ingram, Ed.D.
Executive Director
for Curriculum and Instruction

Wendy R. Vavrousek, M.S.
Executive Director
for Student Support Services

53 West River Road
P.O. Box 449
Louisburg, NC 27549
Phone 919.496.2600
Fax 919.496.2104
www.fcschools.net

Queridos Padres de Familia,

Esta carta es para informarles de un recién brote de varicela en la escuela de su niño. La varicela es una de las enfermedades más contagiosas de todas. Esta enfermedad está esparcida de persona a persona a través de toser, bostizar, y contacto con fluidos de ampollas, o el hecho de estar cerca de una persona contagiosa. El plazo de incubación es de 2 a 3 semanas. Las síntomas incluyen una calentura y el desarrollamiento de manchas rojas que se hacen más grandes, ampollas llenas de fluido que empiezan en el torso y se esparcen a otras extremidades, por ejemplo, la cara, el cabelludo, los brazos, y las piernas. El plazo contagioso normalmente dura de uno a dos días antes del comienzo de una erupción y sigue hasta que todas las lesiones se formen cortezas en unos cinco días aproximadamente.

Hay una vacuna para la varicela y tanto el Centro para el Control de Enfermedades como el Departamento de Salud del Condado de Franklin recomiendan que su niño sea vacunado. A pesar de que un niño haya tenido la vacuna, todavía existe la posibilidad de que el niño pueda sufrir un episodio leve de esta enfermedad. Se recomienda que su niño sea vacunado una segunda vez si es que el niño ha tenido una sola vacuna. También se recomienda que su niño sea vacunado inmediatamente si es que el/ella nunca ha tenido ni la vacuna o la enfermedad. La vacuna mejora la protección del individuo en contra de la varicela y reduce el impacto de brotes en la escuela. Si se usa la vacuna dentro de tres a cinco días después de haber sido expuesto, la vacuna puede prevenir o reducir significativamente la severidad de la enfermedad. A los estudiantes en el kindergarten a quienes se les han sido obligados por el estado a tener la vacuna serán excluidos de la escuela durante el brote si no tienen una prueba de la vacuna o la enfermedad. Esto incluye a los estudiantes con exenciones por razones religiosas o médicas. Los estudiantes en la secundaria con exenciones por razones religiosas o medicas serán avisados sobre los riesgos de contraer la varicela en el ambiente escolar. Es importante que se les informen a las mujeres embarazadas y bebés sobre el riesgo de exposición. Si está embarazada y ha tenido contacto con alguien que tenga varicela, póngase en contacto inmediatamente con su médico.

Si su niño tiene varicela, la póliza del Condado de Franklin requiere que el estudiante sea excluido de la escuela a lo menos cinco días o hasta que las lesiones estén secas. Le agradecemos por haber cooperado con nuestras recomendaciones y la póliza escolar para reducir la diseminación de esta enfermedad.

Atentamente,

Marla R. Peoples

Marla Peoples
Directora de Servicios Estudiantiles

Wendy R. Vavrousek

Wendy Vavrousek
Directora Ejecutiva de Servicios de Apoyo para Estudiantes